2025/09/19 1/7 ICD-9

ICD-9

1975年のICD-9におけるアディクションの項目。

この項の出典:

□WHO, Manual of the international statistical classification of disease, injuries, and causes of death. Based on the Recommendations of the Nineth Revision Conference, 1975, and Adopted by the Twenty-nineth World Health Assembly, WHO, 1975, iris. Volume I Part 1 PDF

LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES

V. MENTAL DISORDERS

Neurotic disorders, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders (300-316) ☐300 Neurotic disorders

□301 Personality disorders

□302 Sexual deviations and disorders

□303 Alcohol dependence syndrome

□304 Drug dependence

p.12

TABULAR LIST OF INCLUSIONS AND FOUR-DIGIT SUBCATEGORIES

V. MENTAL DISORDERS

NEUROTIC DISORDERS, PERSONALITY DISORDERS AND OTHER NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS (300-316)

303 Alcohol dependence syndrome

A state, psychic and usually also physical, resulting from taking alcohol, characterized by behaivioural and other responses that always include a compulsion to take alcohol on a continuous or periodic basis in order to experience its psychic effects, and sometimes to avoid the discomfort of its absence; tolerance may or may not be present. A person may be dependent on alcohol and other drugs; if so also make the appropriate 304 coding. If dependence is associated with alcoholic psychosis or with physical complications, both should be coded.

Acute drunkenness in alcoholism Dipsomania Chronic alcoholism

Excludes: alcoholic psychoses (291.-)

st update: 021/01/22	dependence:diagnostic:diagnostic_criteria_icd_9 https://ieji.org/wiki/dependence/diagnostic/diagnostic_criteria_icd_
□drunkenness □physical com □□cirrhosis of l □□epilepsy (34 □□gastritis (53	plications of alcohol, such as: iver (571.2) 5)
304 Drug de	pendence
behavioural ar or periodic bas	ic and sometimes also physical, resulting from taking a drug, characterized by and other responses that always include a compulsion to take a drug on a continuous is in order to experience its psychic effects, and sometimes to avoid the discomfort Tolerance mayor may not be present. A person may be dependent on more than

sychic effects, and sometimes to avoid the discomfort present. A person may be dependent on more than one drug.

Excludes: nondependent abuse of drugs (305.-)

304.0 Morphine type

Heroin

Methadone

Opium

Opium alkaloids and their derivatives

Synthetics with morphine-like effects

304.1 Barbiturate type

Barbiturates

Nonbarbiturate sedatives and tranquillizers with a similar effect:

□chlordiazepoxide

∏diazepam

□glutethimide

□meprobamate

304.2 Cocaine

Coca leaves and derivatives

304.3 Cannabis

Hemp

Hashish

Marijuana

304.4 Amphetamine type and other psychostimulants

Phenmetrazine

Methylphenidate

304.5 Hallucinogens

LSD and derivatives

Mescaline

Psilocybin

https://ieji.org/wiki/ Printed on 2025/09/19 2025/09/19 3/7 ICD-9

304.6 Other

Absinthe addiction

Glue sniffing

Excludes: tobacco dependence (305.1)

304.7 Combinations of morphine type drug with any other

304.8 Combinations excluding morphine type drug

304.9 Unspecified

Drug addiction NOS Drug dependence NOS

305 Nondependent abuse of drugs

Includes cases where a person, for whom no other diagnosis is possible, has come under medical care because of the maladaptive effect of a drug on which he is not dependent (as defined in 304.-) and that he has taken on his own initiative to the detriment of his health or social functioning. When drug abuse is secondary to a psychiatric disorder, code the disorder.

Excludes: alcohol dependence syndrome (303)

□drug dependence (304.-)

□drug withdrawal syndrome (292.0)

poisoning by drugs or medicaments (960-979)

305.0 Alcohol

Cases of acute intoxication or "hangover" effects.

Drunkenness NOS

Excessive drinking of alcohol NOS

"Hangover" (alcohol)

Inebriety NOS

Excludes: alcoholic psychoses (291.-)

physical complications of alcohol, such as:

 $\square\square$ cirrhosis of liver (571.2)

□□epilepsy (345.-)

 $\square\square$ gastritis (535.3)

305.1 Tobacco

Cases in which tobacco is used to the detriment of a person's health or social functioning or in which there is tobacco dependence. Dependence is included here rather than under 304.- because tobacco differs from other drugs of dependence in its psychotoxic effects.

Tobacco dependence

305.2 Cannabis

305.3 Hallucinogens

Cases of acute intoxication or "bad trips".

LSD reaction

305.4 Barbiturates and tranquillizers

Cases where a person has taken the drug to the detriment of his health or social functioning, in doses above or for periods beyond those normally regarded as therapeutic.

305.5 Morphine type

305.6 Cocaine type

305.7 Amphetamine type

305.8 Antidepressants

305.9 Other, mixed or unspecified

"Laxative habit" Misuse of drugs NOS Nonprescribed use of drugs or patent medicinals

303 アルコール依存症候群

アルコールを摂取した結果としての精神の(通常は身体も)状態であり、その精神的な効果を感じるために、そして時にはその欠如による不快感を避けるために、連続的あるいは周期的にアルコールを摂取する強迫的欲求を常に含む行動その他の反応によって特徴づけられる。耐性は起きている場合も起きていない場合もある。その人がアルコールとその他の薬物に依存している場合には、適切な304のコーディングも行う。アルコール性精神病を伴う場合、あるいは身体的合併症を伴う場合、どちらもコーディングされるべきである。

アルコホリズムによる急性酩酊 ディスポマニア 慢性アルコホリズム

除外:アルコール性精神病 (291.-) 他に分類されない酩酊 (305.0) アルコールの身体合併症、例) 肝硬変 (571.2) てんかん (345.-) 胃炎 (535.3)

304 薬物依存症

薬物を摂取した結果としての精神の(通常は身体も)状態であり、その精神的な効果を感じるために、そして時にはその欠如による不快感を避けるために、連続的あるいは周期的に薬物を摂取する強迫的欲求を常に含む行動その他の反応によって特徴づけられる。耐性は起きている場合も起きていない場合もある。同時に二つ以上の薬物の依存になりうる。

除外:依存ではない薬物乱用(305.-)

304.0 *モルヒネ型*

ヘロイン メタドン アヘン

ァ マヘンアルカロイドおよびその派生物

https://ieji.org/wiki/ Printed on 2025/09/19

モルヒネ様の効果を持つ薬品

304.1 バルビツール酸型

バルビツール酸 同様の効果を持つ非バルビツール酸系鎮静剤および精神安定剤 クロルジアゼポキシド ジアゼパム グルテチミド メプロバメート

304.2 *コカイン*

コカの葉およびその派生物

304.3 大麻

インド大麻 ハシシ マリファナ

304.4 アンフェタミン型および他の精神刺激薬

フェンメトラジン メチルフェニデート

304.5 幻覚剤

LSDおよびその派生物 メスカリン サイロシビン

304.6 その他

アブサン嗜癖 接着剤吸入

除外: タバコ依存 (305.1)

304.7 モルヒネ型薬物とその他の組み合わせ

304.8 モルヒネ型以外の薬物の組み合わせ

304.9 特定不能

特定不能の薬物嗜癖 特定不能の薬物依存

305 薬物の非依存的乱用

ここには、他の診断を与えられない人で、(304.-で定義されたようには)依存していない薬物の非適応性の効果によって医療的ケアを受けることになっており、かつ自らの意思で健康あるいは社会的機能を損なったケースが含まれる。薬物乱用が精神疾患の二次的なものである場合、その疾患をコードする。

除外:アルコール依存症候群 (303)

薬物依存 (304.-)

薬物離脱症候群 (292.0)

薬物 薬剤の中毒 (960-979)

305.0 アルコール

急性中毒あるいは「二日酔い」の効果であるケース その他に分類されない酩酊状態 その他に分類されない大量飲酒 「二日酔い」(アルコールの) その他に分類されない飲酒癖

除外: アルコール性精神病 (291.-) アルコールによる身体合併症、例として: 肝硬変 (571.2) てんかん (345.-) 胃炎 (535.3)

305.1 タバコ

タバコの使用がその人の健康あるいは社会的機能を損なっている場合、あるいはタバコ依存の場合。依存は304.ではなくここに含められる。なぜならタバコの精神毒性の効果は、他の依存性薬物とは異なるからである。

タバコ依存

305.2 大麻

305.3 幻覚剤

急性中毒あるいは「バッド・トリップ」の場合 LSD反応

305.4 バルビツレートと精神安定剤

その薬物の摂取がその人の健康あるいは社会的機能を損なっており、治療に効果的であると通常見な される量あるいは期間を超えて服用した場合。

305.5 *モルヒネ型*

305.6 コカイン型

305.7 アンフェタミン型

305.8 抗うつ薬

305.9 その他、混合あるいは特定不能

「下剤癖」

特定不能の薬物の誤用 薬物あるいは特許薬(民間のまがい薬)の非処方による使用

pp.198-201

Other

302 Sexual deviations and disorders — 性的逸脱
 302.0 Homosexuality — 同性愛

https://ieji.org/wiki/ Printed on 2025/09/19

2025/09/19 7/7 ICD-9

- Lesbianism レズビアニズム
- 。 302.1 Bestiality 獣姦
- ∘ 302.2 Pedophilia 小児性愛
- 302.3 Transvestitism 服装倒錯
- ∘ 302.4 Exhibitionism 露出症
- 302.5 Trans-sexualism 性転換症
- 302.6 Disorders of psychosexual identity 性心理同一性障害
 - Gender-role disorder 性的役割障害
- 。 302.7 Frigidity and impotence 不感症およびインポテンス
- 。 302.8 Other その他
 - Fetishism フェティシズム
 - Sadism サディズム
 - Masochism マゾヒズム
- ∘ 302.9 Unspecified 特定不能
- 307 Special symptoms not elsewhere classified
 - 307.1 Anorexia nervosa 神経性無食欲症

From:

https://ieji.org/wiki/ - 心の家路

Permanent link:

https://ieji.org/wiki/dependence/diagnostic/diagnostic_criteria_icd_9

Last update: 2021/01/22

