

## 情動障害, 後遺の, アルコール・薬物に関連した

**affective disorder, residual, alcohol- or drug-related** — 情動障害, 後遺の, アルコール・薬物に関連した

Alcohol- or drug-induced changes in affect that persist beyond the period during which a direct effect of the alcohol or drug might reasonably be assumed to be operating.

**See also:** psychotic disorder, residual and late onset, alcohol- or drug-induced

アルコールもしくは薬物に誘発された情動の変化で、アルコールや薬物の直接の影響が及ぶと合理的に推定される期間を超えて残存するもの。

**参照:** [psychotic disorder, residual and late onset, alcohol- or drug-induced](#)

WHO (1994)<sup>1)</sup>, p.7

→[Lexicon of alcohol and drug terms \(WHO\)](#)

1)

WHO (1994), *Lexicon of alcohol and drug terms*. Geneva: World Health Organization →[Lexicon of alcohol and drug terms \(WHO\)](#)

From:

<http://www.ieji.org/wiki/> - 心の家路

Permanent link:

[http://www.ieji.org/wiki/lexicon/affective\\_disorder\\_residual\\_alcohol-or\\_drug-related](http://www.ieji.org/wiki/lexicon/affective_disorder_residual_alcohol-or_drug-related)

Last update: **2024/04/28**

