

依存症候群

dependence syndrome (F1x.2) — 依存症候群 (F1x.2)

A cluster of behavioural, cognitive, and physiological phenomena that may develop after repeated substance use. Typically, these phenomena include a strong desire to take the drug, **impaired control** over its use, persistent use despite harmful consequences, a higher priority given to drug use than to other activities and obligations, increased **tolerance**, and a physical **withdrawal** reaction when drug use is discontinued. In ICD-10, the diagnosis of dependence syndrome is made if three or more of six specified criteria were experienced within a year . The dependence syndrome may relate to a specific substance (e.g. tobacco, **alcohol**, or **diazepam**), a class of substances (e.g. **opioids**), or a wider range of pharmacologically different substances.

See also: addiction; alcoholism; dependence; substance use disorders

物質を繰り返し使用した後に発現する行動、認知、生理学的な症状群である。典型的には、薬物を摂取したいという強い欲望、その使用の**コントロールの減弱**、有害な結果があるにも関わらず使用を続ける、他の活動や責務よりも薬物を使用することへの高い優先度、増大した**耐性**、薬物使用を中断した際の**離脱**反応といった症状が含まれる。ICD-10では、6つの診断項目のうち1年以内に3つが見られる場合に、依存症候群と診断される。依存症候群は特定の物質（例：タバコ、**アルコール**、**ジアゼパム**）、特定の種類（例：**オピオイド**）、あるいは薬理的に多様な物質と関係しうる。

参照 **嗜癖**、**アルコール症** (alcoholism)、**依存**、物質使用障害 (substance use disorders) WHO (1994)¹⁾, p.29

→[Lexicon of alcohol and drug terms](#) (WHO)

1)

WHO (1994), *Lexicon of alcohol and drug terms*. Geneva: World Health Organization →[Lexicon of alcohol and drug terms](#) (WHO)

From:

<https://ieji.org/wiki/> - 心の家路

Permanent link:

https://ieji.org/wiki/lexicon/dependence_syndrome

Last update: **2024/04/28**

