

ジェリネックの類型学

→ジェリネックによるアルコール症の諸型

Jellinek's typology — ジェリネックの類型学

Jellinek's classification of **alcoholism**, as outlined in *The disease concept of alcoholism* (1960).¹

- *alpha alcoholism*—characterized by psychological **dependence**, with no progression to physiological dependence; also called **problem drinking, escape drinking**.
- *beta alcoholism*—characterized by physical complications involving one or more organ systems, with a general undermining of health and shortened life span.
- *gamma alcoholism*—characterized by increasing **tolerance, loss of control**, and precipitation of a **withdrawal syndrome on cessation** of alcohol intake; also called “Anglo-Saxon” alcoholism.
- *delta alcoholism*—characterized by increasing **tolerance**, withdrawal symptoms, and **inability to abstain**, but not **loss of control** of the amount of intake on any occasion. (See **alcoholization**.)
- *epsilon alcoholism*—paroxysmal or periodic drinking, **binge drinking**; sometimes referred to as **dipsomaia**.

『アルコール症の疾病概念』（1960）¹で述べられた、ジェリネックによる**アルコール症（alcoholism）**の分類。

- α 型アルコール症—精神的**依存**によって特徴づけられるが、生理学的依存に進行性は見られない。問題飲酒〔problem drinking〕、逃避型飲酒〔escape drinking〕とも呼ばれる。
- β 型アルコール症—ひとつあるいは複数の臓器の身体的合併症、全般的な健康の衰えと寿命の短縮によって特徴づけられる。
- γ 型アルコール症—**耐性**の増大、**コントロールの喪失**、アルコール摂取を中断した際の**離脱症状**の出現によって特徴づけられる。アングロサクソン型アルコール症とも。
- δ 型アルコール症—**耐性**の増大、離脱症状、**断酒の不能**によって特徴づけられるが、いかなる状況でもアルコールを摂取する量の**コントロールの喪失**はない。（**アルコホリゼーション**を参照）。
- ϵ 型アルコール症—一過性あるいは周期性の大量飲酒〔binge drinking〕、時に**渴酒症〔dipsomaia〕**と呼ばれる。

1. Jellinek EM. *The disease concept of alcoholism*. New Haven, CT, Hillhouse, 1960. WHO (1994)¹⁾, p.43-44

→*Lexicon of alcohol and drug terms* (WHO)

¹⁾

WHO (1994), *Lexicon of alcohol and drug terms*. Geneva: World Health Organization →*Lexicon of*

alcohol and drug terms (WHO)

From:

<https://ieji.org/wiki/> - 心の家路

Permanent link:

https://ieji.org/wiki/lexicon/jellinek_s_typology

Last update: **2024/04/28**

